

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

使用上の注意改訂のお知らせ

パーキンソニズム治療剤
レボドパ・カルビドパ水和物錠

ドパコール[®]配合錠L50
ドパコール[®]配合錠L100
ドパコール[®]配合錠L250

処方箋医薬品^(注)

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

この度、標記製品の使用上の注意を改訂しましたので、お知らせ申し上げます。

2024年2月

製造販売元

DAITO ダイト株式会社
富山県富山市八日町326番地

販売元

 **扶桑薬品工業株式会社**
大阪市城東区森之宮二丁目3番11号

1. 改訂内容（自主改訂：_____）

改訂後				改訂前			
8. 重要な基本的注意				8. 重要な基本的注意			
8.1~8.3（省略、変更なし）				8.1~8.3（省略）			
8.4 セレギリン塩酸塩等（B型モノアミン酸化酵素阻害剤）との併用に際しては、使用前に必ずセレギリン塩酸塩等の電子添文を参照すること。				8.4 セレギリン塩酸塩等（B型モノアミン酸化酵素阻害剤）との併用に際しては、使用前に必ずセレギリン塩酸塩等の添付文書を参照すること。			
8.5~8.6（省略、変更なし）				8.5~8.6（省略）			
11. 副作用				11. 副作用			
（省略、変更なし）				（省略）			
11.1 重大な副作用				11.1 重大な副作用			
（省略、変更なし）				（省略）			
11.2 その他の副作用				11.2 その他の副作用			
	1%以上	1%未満	頻度不明		1%以上	1%未満	頻度不明
（省略、変更なし）				（省略）			
泌尿器			排尿異常、 尿路感染	泌尿器			排尿異常
（省略、変更なし）				（省略）			

2. 改訂理由

先発製剤の CCDS の変更に伴い、「副作用」の「その他の副作用」の項を一部改訂しました。また、記載整備を行いました。

3. 本情報は医薬品安全対策情報（DSU）No.324 に掲載されます。

☆添付文書情報は、「医薬品医療機器総合機構ホームページ (URL: <https://www.pmda.go.jp/>)」及び「弊社ホームページ (URL: <https://www.fuso-pharm.co.jp/>)」においてご確認ください。
スマートフォン等モバイル端末からは、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」をダウンロードし、GS1 バーコードを読み取ることで最新の電子添文を閲覧できます。



(01)14987197483195

【本件に関するお問い合わせ先】
扶桑薬品工業株式会社 安全管理統括部
TEL 06-6969-1131 FAX 06-6969-3139