



2017年11月

使用上の注意改訂のお知らせ

広範囲抗菌点眼剤

日本薬局方 レボフロキサシン点眼液

レボフロキサシン点眼液1.5%「科研」

Levofloxacin Ophthalmic Sol.

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

■改訂内容（ ：改訂部分、 ：削除部分）

改訂後	改訂前
<p>【使用上の注意】</p> <p>1. 副作用</p> <p>(1) 重大な副作用（頻度不明）</p> <p>ショック、アナフィラキシー</p> <p>ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、観察を十分に行い、紅斑、発疹、呼吸困難、血圧低下、眼瞼浮腫等の症状が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p>	<p>【使用上の注意】</p> <p>1. 副作用</p> <p>(1) 重大な副作用（頻度不明）</p> <p>ショック、アナフィラキシー</p> <p>0.5%製剤で、ショック、アナフィラキシーを起こすとの報告があるので、観察を十分に行い、紅斑、発疹、呼吸困難、血圧低下、眼瞼浮腫等の症状が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p>

■改訂理由

同一成分薬の使用上の注意の改訂に伴い、自主改訂により「重大な副作用」の項を改訂いたしました。

なお、改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報（DSU）No.265」（2017年12月）に掲載されます。また、改訂後の添付文書全文につきましては、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）、または弊社ホームページ（<http://www.kaken.co.jp/>）でご確認ください。





発売元

科研製薬株式会社

東京都文京区本駒込2丁目28-8

DAITO

製造販売元

ダイト株式会社

富山県富山市八日町326番地