



2016年12月

# 「効能・効果」及び「用法・用量」 追加のお知らせ

抗血小板剤

日本薬局方 クロピドグレル硫酸塩錠

## クロピドグレル錠25mg「科研」 クロピドグレル錠75mg「科研」

Clopidogrel Tab.

このたび、標記製品について、医薬品製造販売承認事項一部変更承認を取得し、「効能・効果」及び「用法・用量」が追加されましたので、お知らせ申し上げます。

なお、「使用上の注意」の変更はございません。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

### ■改訂内容（ \_\_\_\_\_：追記部分）

改訂後	改訂前
<p><b>【効能・効果】</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症を除く）後の再発抑制</li><li>経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される下記の虚血性心疾患 急性冠症候群（不安定狭心症、非 ST 上昇心筋梗塞、ST 上昇心筋梗塞） 安定狭心症、陳旧性心筋梗塞</li><li><u>末梢動脈疾患における血栓・塞栓形成の抑制</u></li></ul> <p><b>【用法・用量】</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症を除く）後の再発抑制の場合 通常、成人には、クロピドグレルとして <b>75mg</b> を 1 日 1 回経口投与するが、年齢、体重、症状によりクロピドグレルとして <b>50mg</b> を 1 日 1 回経口投与する。</li><li>経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される虚血性心疾患の場合 通常、成人には、投与開始日にクロピドグレルとして <b>300mg</b> を 1 日 1 回経口投与し、その後、維持量として 1 日 1 回 <b>75mg</b> を経口投与する。</li><li><u>末梢動脈疾患における血栓・塞栓形成の抑制の場合</u> <u>通常、成人には、クロピドグレルとして 75mg を 1 日 1 回経口投与する。</u></li></ul>	<p><b>【効能・効果】</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症を除く）後の再発抑制</li><li>経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される下記の虚血性心疾患 急性冠症候群（不安定狭心症、非 ST 上昇心筋梗塞、ST 上昇心筋梗塞） 安定狭心症、陳旧性心筋梗塞</li></ul> <p>←追加</p> <p><b>【用法・用量】</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症を除く）後の再発抑制の場合 通常、成人には、クロピドグレルとして <b>75mg</b> を 1 日 1 回経口投与するが、年齢、体重、症状によりクロピドグレルとして <b>50mg</b> を 1 日 1 回経口投与する。</li><li>経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される虚血性心疾患の場合 通常、成人には、投与開始日にクロピドグレルとして <b>300mg</b> を 1 日 1 回経口投与し、その後、維持量として 1 日 1 回 <b>75mg</b> を経口投与する。</li></ul> <p>←追加</p>

なお、改訂後の添付文書全文につきましては、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）、または弊社ホームページ（<http://www.kaken.co.jp/>）でご確認ください。





発売元  
**科研製薬株式会社**  
東京都文京区本駒込2丁目28-8

製造販売元  
**DAITO** **ダイト株式会社**  
富山県富山市八日町326番地