



2013年12月 - 2014年1月

「用法・用量」改訂のお知らせ

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

ピタバスタチンCa錠1mg「科研」 ピタバスタチンCa錠2mg「科研」

Pitavastatin Calcium Tab.
ピタバスタチンカルシウム錠

このたび、標記製品について、医薬品製造販売承認事項一部変更承認を取得し、「用法・用量」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。

「使用上の注意」の変更はございません。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

■改訂内容（ ：削除部分）

改訂項目	用法・用量	改訂区分	医薬品製造販売承認事項一部変更承認
	改 訂 後		改 訂 前
【用法・用量】 通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。			【用法・用量】 通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回夕食後に経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。

なお、改訂後の添付文書全文につきましては、医薬品医療機器総合機構の情報提供ホームページ（<http://www.info.pmda.go.jp/>）、ならびに弊社ホームページ（<http://www.kaken.co.jp/medical/>）でご確認ください。



発売元

科研製薬株式会社

東京都文京区本駒込2丁目28-8

DAITO

製造販売元

ダイト株式会社

富山県富山市八日町326番地